

定期予防接種一覧

予防接種名		対象者	標準的な接種期間	回数
B型肝炎		生後1歳に至るまで	生後2～9か月未満	3回
ロタウイルス	1価	生後6週から24週0日	生後2か月から、接種後27日以上間隔をあけて接種を行う。ただし、生後14週6日以内に初回接種を行うこと。	2回
	5価	生後6週から32週0日		3回
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib)		第1期初回 生後2～90か月に至るまで	生後2～7か月に至るまで 〔20日以上の間隔をおいて〕	3回
		第1期追加 生後2～90か月に至るまで	第1期初回接種（3回）終了後、 6～18か月までの間隔をおいて	1回
小児肺炎球菌 (生後7か月以降に接種を開始する場合は、接種回数が異なりますので、※1をご覧ください)		第1期初回 生後2～60か月に至るまで	生後2～7か月に至るまで 〔27日以上の間隔をおいて〕	3回
		第1期追加 生後2～60か月に至るまで	第1期初回接種（3回）終了後、 12～15か月までの期間 〔60日以上の間隔をおいて〕	1回
BCG		生後1歳に至るまで	生後5～8か月に達するまで	1回
麻しん風しん混合 (MR)		第1期 生後12～24か月に至るまで	1歳を過ぎたらなるべく早く	1回
		第2期 5歳以上7歳未満かつ 就学前の1年間	小学校に入る前の1年間のみ (年長児対象)	1回
水痘		初回 生後12～36か月に至るまで	生後12～15か月に達するまで	1回
		追加 生後12～36か月に至るまで	初回接種終了後、 6～12か月までの間隔をおいて	1回
日本脳炎		第1期初回 生後6～90か月に至るまで	3歳～4歳に達するまで 〔6日～28日の間隔をおいて〕	2回
		第1期追加 生後6～90か月に至るまで	4歳～5歳に達するまで 〔初回接種終了後おおむね1年おいて〕	1回
		第2期 9歳以上13歳未満	9歳～10歳に達するまで	1回
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		第2期 11歳以上13歳未満	11歳～12歳に達するまで (小学6年生対象)	1回
ヒトパピローマウイルス		小学6年生～高校1年生までの年齢に相当する女子	中学1年生	2回 または 3回